

## *Anabacerthia ruficaudata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)

Alexandre Luis Padovan Aleixo; Carlos Martínez Ruiz; Diego Mendes Lima; Edson Varga Lopes; Pablo Vieira Cerqueira; Sidnei de Melo Dantas; Túlio Dornas de Oliveira

### Como citar

Aleixo, A.L.P.; Ruiz, C.M.; Lima, D.M.; Lopes, E.V.; Cerqueira, P.V.; Dantas, S.M.; Oliveira, T.D. 2023. *Anabacerthia ruficaudata*. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade - SALVE. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Disponível em: <https://salve.icmbio.gov.br> Digital Object Identifier (DOI): <https://doi.org/10.37002/salve.ficha.20862> - Acesso em: 26 de fev. de 2025.

### Categoria: Menos Preocupante (LC)

Última avaliação: 29/09/2017

Ano da publicação: 2023

### Justificativa

*Anabacerthia ruficaudata* ocorre na Colômbia, Peru, Bolívia, Guianas e Brasil, em grandes extensões de habitat íntegro que necessita para sua sobrevivência. Não são conhecidas ameaças para esta espécie até o momento. Desta forma, *A. ruficaudata* foi categorizada como Menos Preocupação (LC).

## Classificação Taxonômica

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Furnariidae

Gênero: *Anabacerthia*

Espécie: *Anabacerthia ruficaudata*



Autor: Ciro Albano

### Nomes Comuns

- limpa-folha-de-cauda-ruiva (Português)
- Rufous-tailed Foliage-gleaner (Inglês)
- Ticotico Colirrufo (Espanhol)

### Nomes Antigos

- *Anabates ruficaudatus* d'Orbigny & Lafresnaye, 1838
- *Philydor ruficaudatum* d'Orbigny & Lafresnaye, 1838

### Notas Taxonômicas e Morfológicas

Três subespécies reconhecidas, duas delas ocorrem no Brasil, *Anabacerthia ruficaudata flavipectus* – sudeste da Colômbia (sul para oeste de Meta e Vaupés), sudeste da Venezuela (sul para o centro Amazonas e noroeste d Bolívia), Guianas e nordeste do Brasil; *A. ruficaudata ruficaudatum* - Guianas, nordeste e Amazônia brasileira (leste do Amazonas ao oeste do Maranhão), sudeste do Peru e norte da Bolívia

(Remsen, 2003).

## Distribuição

**Endêmica do Brasil:** Não

### Distribuição Global

Sudeste da Colômbia (sul para oeste de Meta e Vaupés), sudeste da Venezuela (sul para o centro Amazonas e noroeste da Bolívia), Guianas, sudeste do Peru e Amazônia brasileira (leste do Amazonas ao oeste do Maranhão) (Remsen, 2003).

### Distribuição Nacional

Ocorre nos estados Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

### Estados

Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins

### Biomass

Amazônia, Cerrado

### Bacias Hidrográficas

Sub-bacia Amapá Litoral, Sub-bacia Araguaia, Sub-bacia Madeira, Sub-bacia Mearim, Sub-bacia Negro, Sub-bacia Solimões, Sub-bacia Tapajós, Sub-bacia Tocantins Baixo, Sub-bacia Xingu

## História Natural

Ocorre em mata de terra firme e mata de várzea na Amazônia (Sigrist, 2006).

## População

**Tempo geracional:** 4,7 Ano(s)

**Tendência populacional:** Desconhecida

### Características Genéticas

Não existem informações até o momento.

### Observações sobre a população

Não se conhece informações acerca da população desta espécie até o momento.

## Ameaças

Não se conhece ameaças para esta espécie até o momento.

## Usos

Não foram encontradas informações para o táxon.

## Conservação

### Última avaliação

Data: 12/11/2018

Categoria: Menos Preocupante (LC)

### Histórico do processo de avaliação

| Tipo            | Ano  | Abrangência | Categoria              | Critério | Referência bibliográfica |
|-----------------|------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|
| Global          | 2012 |             | Menos Preocupante (LC) |          | IUCN, 2012               |
| Nacional Brasil | 2014 |             | Menos Preocupante (LC) |          |                          |

\* Categoria não utilizada no método IUCN.

### Presença em UC/TI

| UC/TI   | Referência Bibliográfica       |
|---|--------------------------------|
| Rebio do Gurupi                               |                                |
| Área de Proteção Ambiental do Lago de Tucuruí | Wikiaves, 2018                 |
| RPPN Lote Cristalino                          | CEMAVE, 2018<br>Wikiaves, 2018 |
| RPPN Retiro Boa Esperança                     | CEMAVE, 2018                   |

## Pesquisa

Não são conhecidas pesquisas específicas sobre *A. ruficaudata* que estejam sendo desenvolvidas atualmente no Brasil.

### Equipe Técnica

Fabiane Fileto Dias, Murilo Sergio Arantes, Carine Emer.



Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio  
Processo de Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira

| Avaliadores |
|-------------|
|-------------|

|  |
|--|
| Alexandre Luis Padovan Aleixo, Carlos Martínez Ruiz, Diego Mendes Lima, Edson Varga Lopes, Pablo Vieira Cerqueira, Sidnei de Melo Dantas, Túlio Dornas de Oliveira |
|--|

| Validadores |
|-------------|
|-------------|

|  |
|--|
| Harry Boos Junior, Arthur Jorge Brant Caldas Pereira, Arthur Jorge Brant Caldas Pereira, Harry Boos Junior |
|--|



Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio  
Processo de Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira

## Referências Bibliográficas

---

IUCN, (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Versão 2012.2. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org>. Acessado em: 22/02/2013.

Remsen, J.V. 2003. Family Furnariidae. p.162-357. *In*: del Hoyo *et al.*. Handbook of the Birds of the World. Lynx Edicions

Sigrist, T. 2006. Aves do Brasil: Uma visão artística. p.672. Avis Brasilis Editora

Sigrist, T. 2006. Aves do Brasil: Uma visão artística. p.672. Avis Brasilis Editora



Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio  
Processo de Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira

## Referências dos Registros

---

CEMAVE, (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres) 2018. Banco de dados do CEMAVE (BD-GEO).

Wikiaves 2018. A Enciclopédia das Aves do Brasil. Disponível em: <http://www.wikiaves.com.br>.